

صحيفة الحقائق للمرضى والآباء ومقدمي الرعاية

تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) لعقار باكسلوفيد لمرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)

يتم إعطاؤك صحيفة الحقائق هذه لأن مقدم الرعاية الصحية يعتقد أنه من الضروري تزويدك بعقار باكسلوفيد لعلاج مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) الخفيف إلى المتوسط الناجم عن فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة. تحتوي صحيفة الحقائق هذه على معلومات لمساعدتك على فهم مخاطر وفوائد استخدام عقار باكسلوفيد الذي تلقينته أو قد تتلقاه. تحتوي صحيفة الحقائق هذه أيضاً على معلومات حول كيفية تناول عقار باكسلوفيد وكيفية الإبلاغ عن الآثار الجانبية أو المشكلات المتعلقة بمظهر عقار باكسلوفيد أو تغليفه.

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) لإتاحة عقار باكسلوفيد أثناء جائحة كوفيد-19 (لمزيد من التفاصيل حول تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ، يُرجى الاطلاع على "ما هو تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ؟" في نهاية هذا المستند). عقار باكسلوفيد ليس دواءً معتمداً من إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة. اقرأ صحيفة الحقائق هذه للحصول على معلومات حول عقار باكسلوفيد. تحدث مع مقدم الرعاية الصحية عن الخيارات المتاحة لك أو إذا كانت لديك أي أسئلة. الأمر متروك لك لتناول عقار باكسلوفيد.

ما هو كوفيد-19؟

يحدث كوفيد-19 بسبب فيروس اسمه فيروس كورونا. يمكن أن تصاب بفيروس كوفيد-19 من خلال مخالطة شخص آخر مصاب بالفيروس.

تراوحت أمراض كوفيد-19 من خفيفة جداً إلى شديدة، بما في ذلك المرض الذي يؤدي إلى الوفاة. على الرغم من أن المعلومات حتى الآن تشير إلى أن معظم أمراض كوفيد-19 خفيفة، إلا إنه يمكن أن تحدث أمراض خطيرة وقد تؤدي إلى تفاقم بعض حالاتك الطبية الأخرى. يبدو أن كبار السن والأشخاص من جميع الأعمار الذين يعانون من حالات طبية شديدة وطويلة الأمد (مزمنة) مثل أمراض القلب، وأمراض الرئة، والسكري، على سبيل المثال، أكثر عرضة لخطر دخول المستشفى بسبب كوفيد-19.

ما هو عقار باكسلوفيد؟

عقار باكسلوفيد هو دواء بحثي يُستخدم لعلاج كوفيد-19 الخفيف إلى المعتدل لدى البالغين والأطفال [12 عاماً فأكثر ويزنون على الأقل 88 رطلاً (40 كجم)] ولديهم نتائج إيجابية لاختبار فيروسي مباشر لفيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة (SARS-CoV-2)، والذين هم في خطر كبير للتقدم إلى كوفيد-19 الشديد، بما في ذلك دخول المستشفى أو الوفاة. يعد عقار باكسلوفيد عقاراً بحثياً لأنه لا يزال قيد الدراسة. هناك معلومات محدودة حول مدى أمان وفعالية استخدام باكسلوفيد لعلاج الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد-19 الخفيف إلى المعتدل.

لقد صرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) باستخدام عقار باكسلوفيد في حالات الطوارئ لعلاج كوفيد-19 الخفيف إلى المتوسط لدى البالغين والأطفال [من عمر 12 عاماً فأكثر الذين يزنون على الأقل 88 رطلاً (40 كجم)] ممن لديهم اختبار إيجابي للفيروس الذي يسبب كوفيد-19، وهم في خطر كبير للتقدم إلى كوفيد-19 الشديد، بما في ذلك دخول المستشفى أو الوفاة، بموجب تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ.

ما الذي يجب أن أخبر به مقدم الرعاية الصحية قبل تناول عقار باكسلوفيد؟

أخبر مقدم الرعاية الصحية في الحالات التالية:

- وجود أي حساسيات
- وجود مرض في الكبد أو الكلى
- الحمل أو التخطيط للحمل
- الرضاعة الطبيعية
- وجود أمراض خطيرة

قد تتفاعل بعض الأدوية مع عقار باكسلوفيد وقد تسبب آثارًا جانبية خطيرة.

- أخبر مقدم الرعاية الصحية عن جميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية والفيتامينات والمكملات العشبية.
- يمكن لمقدم الرعاية الصحية أن يخبرك ما إذا كان تناول باكسلوفيد مع أدوية أخرى آمنًا أم لا.
- يمكنك أن تطلب من مقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي قائمة بالأدوية التي تتفاعل مع عقار باكسلوفيد.
- لا تبدأ في تناول دواء جديد دون إخبار مقدم الرعاية الصحية.

أخبري مقدم الرعاية الصحية المتابع لك إذا كنت تتناولين موانع حمل هرمونية مركبة. قد يؤثر عقار باكسلوفيد على طريقة عمل حبوب منع الحمل. يجب على الإناث القادرات على الحمل استخدام وسيلة بديلة فعالة أخرى لمنع الحمل أو وسيلة عازلة إضافية لمنع الحمل. تحدثي إلى مقدم الرعاية الصحية إذا كانت لديك أي أسئلة حول وسائل منع الحمل التي قد تكون مناسبة لك.

كيف أتناول عقار باكسلوفيد؟

- يتكون عقار باكسلوفيد من دوائين: أقراص نيرماتريلفير وأقراص ريتونافير. يتم تناول الدوائين معًا مرتين يوميًا لمدة 5 أيام.
 - نيرماتريلفير عبارة عن قرص وردي بيضاوي الشكل.
 - ريتونافير عبارة عن قرص أبيض أو أبيض مائل للعاجي.
- يتوفر عقار باكسلوفيد في عبوتي جرعات (انظر الشكلين "أ" و "ب" أدناه). سوف يصف لك مقدم الرعاية الصحية المتابع لك عبوة باكسلوفيد ذات الجرعة المناسبة لك.
- إذا كنت تعاني من مرض في الكلى، فقد يصف لك مقدم الرعاية الصحية جرعة أقل (انظر الشكل ب). تحدثي إلى مقدم الرعاية الصحية المتابع لك للتأكد من حصولك على العبوة ذات الجرعة الصحيحة.

الشكل أ

إذا تلقيت دواء باكسلوفيد 300 ملغ؛ وعبوة الجرعة 100 ملغ: تحتوي كل جرعة على 3 أقراص.

دواء PAXLOVID™
(أقراص نيرماتريلفير؛ أقراص ريتونافير)، معبأة بشكل مشترك للاستخدام عن طريق الفم

تحتوي كل كرتونة على 30 قرصًا في 5 أشرطة، يحتوي كل شريط على 6 أقراص؛

- 4 أقراص نيرماتريلفير (150 ملغ لكل قرص)
- قرصين من ريتونافير (100 ملغ لكل قرص)

300 ملغ؛ 100 ملغ عبوة الجرعة

جرعة الصباح - تناول جميع الأقراص الثلاثة في الوقت نفسه من جزء جرعة الصباح من الشريط (الجانب الأصفر).

جرعة المساء - تناول جميع الأقراص الثلاثة في الوقت نفسه من جزء جرعة المساء من الشريط (الجانب الأزرق).

للإستخدام بموجب تصريح الإستخدام في حالات الطوارئ. Rx فقط

كيفية تناول عقار باكسلوفيد 300 ملغ؛ العبوة ذات جرعة 100 ملغ

جرعة الصباح:
تناول القرصين ذوي اللون الزهري من نيرماتريلفير وقرصًا ذا اللون الأبيض المائل إلى الأبيض المصفر من ريتونافير في الوقت نفسه كل صباح.



جرعة المساء:
تناول قرصين ذوي اللون الزهري من نيرماتريلفير وقرصًا ذا اللون الأبيض المائل إلى الأبيض المصفر من ريتونافير في الوقت نفسه كل مساء.



دواء PAXLOVID™

(أقراص نيرماتريلفير؛ أقراص ريتونافير)، معبأة معًا للاستخدام عن طريق الفم

نيرماتريلفير 300 ملغ؛
ريتونافير 100 ملغ

قرص من
ريتونافير
(100 ملغ)



جرعة الصباح
تناول 3 أقراص
في الوقت نفسه.

قرص من
نيرماتريلفير
(150 ملغ)

دواء PAXLOVID™

(أقراص نيرماتريلفير؛ أقراص ريتونافير)، معبأة معًا للاستخدام عن طريق الفم

نيرماتريلفير 300 ملغ؛
ريتونافير 100 ملغ

قرص من
ريتونافير
(100 ملغ)



جرعة المساء
تناول 3 أقراص
في الوقت نفسه.

قرص من
نيرماتريلفير
(150 ملغ)

الشكل ب

إذا تلتقيت دواء باكسلوفيد 150 ملغ؛ وعبوة الجرعة 100 ملغ: تحتوي كل جرعة على قرصين.



دواء PAXLOVID™
(أقراص نيرماتريلفير؛ أقراص ريتونافير)، معبأة بشكل مشترك للاستخدام عن طريق الفم

تحتوي كل كرتونة على 20 قرصًا في 5 أشرطة، يحتوي كل شريط على 4 أقراص؛

- قرصان من نيرماتريلفير (150 ملغ لكل قرص)
- قرصان من ريتونافير (100 ملغ لكل قرص)

150 ملغ؛ 100 ملغ عبوة الجرعة

جرعة الصباح - تناول كلا القرصين في الوقت نفسه من جزء جرعة الصباح من الشريط (الجانب الأبيض).

جرعة المساء - تناول كلا القرصين في الوقت نفسه من جزء جرعة المساء من الشريط (الجانب الزهري).

للاستخدام بموجب تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ. فقط Rx

كيفية تناول عقار باكسلوفيد 150 ملغ؛ العبوة ذات جرعة 100 ملغ

جرعة الصباح:

تناول قرصًا واحدًا ذا لون زهري من نيرماتريلفير وقرصًا واحدًا ذا لون أبيض مائل إلى الأبيض المصفر من ريتونافير في الوقت نفسه كل صباح.



دواء PAXLOVID™

(أقراص نيرماتريلفير؛ أقراص ريتونافير)، معبأة معًا للاستخدام عن طريق الفم؛ نيرماتريلفير 150 ملغ؛ ريتونافير 100 ملغ

قرص من نيرماتريلفير (150 ملغ)

قرص من ريتونافير (100 ملغ)

جرعة الصباح
تناول كلا القرصين في نفس الوقت.

تُرك تجويف القرص فارغًا عمدًا

جرعة المساء:

تناول قرصًا واحدًا ذا لون زهري من نيرماتريلفير وقرصًا واحدًا ذا لون أبيض مائل إلى الأبيض المصفر من ريتونافير في الوقت نفسه كل مساء.



دواء PAXLOVID™

(أقراص نيرماتريلفير؛ أقراص ريتونافير)، معبأة معًا للاستخدام عن طريق الفم؛ نيرماتريلفير 150 ملغ؛ ريتونافير 100 ملغ

تُرك تجويف القرص فارغًا عمدًا

قرص من ريتونافير (100 ملغ)

جرعة المساء
تناول كلا القرصين في نفس الوقت.

قرص من نيرماتريلفير (150 ملغ)

- لا تتزع أقراص باكسلوفيد الخاصة بك من الشريط قبل أن تكون مستعدًا لتناول جرعتك.
- تناول جرعتك الأولى من عقار باكسلوفيد في الصباح أو المساء، بناءً على موعد استلام الوصفة الطبية، أو حسب توصيات مقدم الرعاية الصحية المتابع لك.
- ابتلع الأقراص كاملة. لا تمضغ الأقراص أو تكسرها أو تسحقها.
- تناول عقار باكسلوفيد مع الطعام أو بدونه.
- لا تتوقف عن تناول باكسلوفيد دون استشارة مقدم الرعاية الصحية، حتى لو شعرت بتحسّن.
- إذا فاتتك جرعة من باكسلوفيد خلال 8 ساعات من الوقت المعتاد لتناولها، فتناولها بمجرد أن تتذكر. إذا فاتتك جرعة لأكثر من 8 ساعات، فتجاوز الجرعة الفائتة وتناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد. لا تتناول جرعتين من باكسلوفيد في نفس الوقت.
- إذا تناولت الكثير من باكسلوفيد، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية أو اذهب إلى أقرب غرفة طوارئ في المستشفى على الفور.
- إذا كنت تتناول دواءً يحتوي على ريتونافير أو كوبيسيستات لعلاج التهاب الكبد C أو فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، فيجب عليك الاستمرار في تناول دوائك على النحو الذي وصفه لك مقدم الرعاية الصحية.

تحدث مع مقدم الرعاية الصحية إذا لم تشعر بتحسّن أو إذا شعرت بأن حالتك قد ساءت بعد 5 أيام.

من الذي ينبغي ألا يتناول باكسلوفيد بوجه عام؟

لا تتناول عقار باكسلوفيد إذا:

- كنت تعاني من حساسية تجاه نيرماتريلفير أو ريتونافير أو أي من مكونات عقار باكسلوفيد.
 - كنت تتناول أيًا من الأدوية التالية:
- | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ○ ألفوزوسين | ○ إيغابرادين | ○ كينيدين |
| ○ أميودارون | ○ لوميتابيد | ○ رانولازين |
| ○ أبالوتاميد | ○ لوفاستاتين | ○ ريفامبين |
| ○ كاربامازيبين | ○ لوماكافتور/إيفاكافتور | ○ نبتة القديس جون (العرن المثقوب) |
| ○ كولثيسين | ○ لوراسيدون | ○ سيلدينافيل (Revatio®) لعلاج |
| ○ داي هيدروار جوتامين | ○ ميثيل إرغونوفين | ○ ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي |
| ○ درونيدارون | ○ ميدازولام (فموي) | ○ (PAH) |
| ○ إيتريبتان | ○ نالوكسيجول | ○ سيلودوسين |
| ○ إبليرينون | ○ فينوباربيتال | ○ سيمفاستاتين |
| ○ إرغوتامين | ○ فينيبتين | ○ تولفابتان |
| ○ فينيرينون | ○ بيموزيد | ○ تريازولام |
| ○ فليكاينيد | ○ بريميدون | ○ أوبروجيبانت |
| ○ فليبانسرين | ○ بروبافينون | ○ فوكلوسبورين |

قد يُسبب تناول عقار باكسلوفيد مع هذه الأدوية آثارًا جانبية خطيرة أو مهددة للحياة أو قد يؤثر على طريقة عمل عقار باكسلوفيد.

ليست هذه الأدوية هي الوحيدة التي قد تسبب آثارًا جانبية خطيرة إذا تم تناولها مع عقار باكسلوفيد. قد يزيد عقار باكسلوفيد أو يقلل من مستويات أدوية أخرى متعددة. من المهم جدًا إخبار مقدم الرعاية الصحية بكل الأدوية التي تتناولها لأن اختبارات معملية إضافية أو تغييرات في جرعة الأدوية الأخرى قد تكون ضرورية في أثناء تناولك لعقار باكسلوفيد. قد يخبرك مقدم الرعاية الصحية أيضًا بأعراض معينة يجب الانتباه لها والتي قد تشير إلى أنك بحاجة إلى إيقاف جرعة بعض الأدوية الأخرى أو تقليلها.

ما الآثار الجانبية المحتملة المهمة لعقار باكسلوفيد؟

الآثار الجانبية المحتملة لعقار باكسلوفيد هي:

- **ردود الفعل التحسسية.** يمكن أن تحدث ردود فعل تحسسية، بما في ذلك ردود فعل تحسسية شديدة (تُعرف باسم "التأق")، لدى الأشخاص الذين يتناولون عقار باكسلوفيد، حتى بعد جرعة واحدة فقط. توقف عن تناول عقار باكسلوفيد واتصل بمقدم الرعاية الصحية على الفور إذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية لرد فعل تحسسي:
 - شرى
 - صعوبة في البلع أو التنفس
 - تورم الفم أو الشفتين أو الوجه
 - ضيق في الحلق
 - بحة في الصوت
 - طفح جلدي
- **مشكلات الكبد.** أخبر مقدم الرعاية الصحية على الفور إذا ظهرت عليك أي من هذه العلامات والأعراض لمشكلات الكبد: فقدان الشهية واصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان) والبول داكن اللون والبراز الشاحب وحكة الجلد وألم منطقة المعدة (البطن).
- **مقاومة أدوية فيروس نقص المناعة البشرية.** إذا كنت مصابًا بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية التي لم يتم علاجها، فقد يؤدي تناول عقار باكسلوفيد إلى عدم عمل بعض أدوية فيروس نقص المناعة البشرية بشكل جيد في المستقبل.

تشتمل الآثار الجانبية المحتملة الأخرى على ما يلي:

- تغير حاسة التذوق
- إسهال
- ضغط دم مرتفع
- أوجاع العضلات
- ألم البطن
- غثيان
- الشعور بالتوعك بصفة عامة

ليست هذه هي كل الآثار الجانبية المحتملة لعقار باكسلوفيد. لم يتناول العديد من الأشخاص عقار باكسلوفيد. قد تحدث آثار جانبية خطيرة وغير متوقعة. لا يزال عقار باكسلوفيد قيد الدراسة، لذا من الممكن أن تكون جميع المخاطر غير معروفة في هذا الوقت.

ما خيارات العلاج الأخرى المتاحة؟

فيكلوري (ريمديسيفير) معتمد من قِبَل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج كوفيد-19 الخفيف إلى المعتدل لدى بعض البالغين والأطفال. تحدث مع مقدم الرعاية الصحية المتابع لك لمعرفة ما إذا كان فيكلوري مناسبًا لك.

مثل عقار باكسلوفيد، قد تسمح إدارة الغذاء والدواء أيضًا بالاستخدام الطارئ لأدوية أخرى لعلاج المصابين بفيروس كوفيد-

19. تفضل زيارة الموقع الإلكتروني <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization>

للحصول على معلومات حول الاستخدام في حالات الطوارئ للأدوية الأخرى المصرح بها من قِبَل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد-19. قد يتحدث معك مقدم الرعاية الصحية عن التجارب السريرية التي قد تكون مؤهلاً لها.

لك حرية الاختيار في أن تُعالج بعقار باكسلوفيد أو لا. إذا قررت عدم تلقيه أو عدم تلقي طفلك له، فلن يغير ذلك من رعايتك الطبية القياسية.

ماذا لو كنتِ حاملاً أو مرضعةً؟

لا توجد خبرة في علاج النساء الحوامل أو الأمهات المرضعات بعقار باكسلوفيد. بالنسبة للأم والجنين، قد تكون فائدة تناول عقار باكسلوفيد أكبر من الخطر الناجم عن العلاج. إذا كنتِ حاملاً، فناقشي خياراتكِ والحالة المحددة مع مقدم الرعاية الصحية.

يوصى باستخدام وسيلة حاجزة فعالة لمنع الحمل أو عدم ممارسة الجنس في أثناء تناول عقار باكسلوفيد.

إذا كنتِ مرضعةً، فناقشي خياراتكِ والحالة المحددة مع مقدم الرعاية الصحية.

كيف يمكنني الإبلاغ عن الآثار الجانبية أو المشكلات المتعلقة بمظهر عقار باكسلوفيد أو تغليفه؟
اتصل بمقدم الرعاية الصحية إذا عانيت من أي آثار جانبية تزعجك أو لا تزول.

أبلغ عن الآثار الجانبية أو المشكلات المتعلقة بمظهر عقار باكسلوفيد أو تغليفه (انظر الشكلين أ وب أعلاه للحصول على أمثلة على عبوات جرعات عقار باكسلوفيد) إلى إدارة الغذاء والدواء **MedWatch** على www.fda.gov/medwatch أو اتصل على الرقم 1-800-FDA-1088 أو يمكنك إبلاغ شركة فايزر بالآثار الجانبية على معلومات الاتصال الواردة أدناه.

رقم الهاتف	رقم الفاكس	الموقع الإلكتروني
1-800-438-1985	1-866-635-8337	www.pfizersafetyreporting.com

كيف ينبغي أن أُخزّن عقار باكسلوفيد؟

خزّن أقراص عقار باكسلوفيد في درجة حرارة الغرفة، بين 68 درجة فهرنهايت و77 درجة فهرنهايت (20 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية).

كيف يمكنني معرفة المزيد عن كوفيد-19؟

- اسأل مقدم الرعاية الصحية.
- تفضل بزيارة <https://www.cdc.gov/COVID19>
- اتصل بإدارة الصحة العامة المحلية أو الخاصة بالولاية.

ما هو تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA)؟

أتاحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عقار باكسلوفيد بموجب آلية وصول في حالات الطوارئ تسمى تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA). تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ مدعوم بإعلان وزير الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) بوجود ظروف تبرر الاستخدام الطارئ لعقاقير ومنتجات بيولوجية في أثناء جائحة كوفيد-19.

عقار باكسلوفيد هو عقار لعلاج كوفيد-19 الخفيف إلى المعتدل لدى البالغين والأطفال [12 عامًا فأكثر ويزنون على الأقل 88 رطلاً (40 كجم)] ممن لديهم نتائج إيجابية لاختبار فيروسي مباشر لفيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة (SARS-CoV-2)، والذين هم في خطر كبير للتقدّم إلى كوفيد-19 الشديد، بما في ذلك دخول المستشفى أو الوفاة، لم يمر بنفس نوع المراجعة التي تتم للمنتج المعتمد من إدارة الغذاء والدواء. عند إصدار تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ في ظل حالة طوارئ الصحة العامة بسبب كوفيد-19، قررت إدارة الغذاء والدواء، من بين أمور أخرى، أنه استناداً إلى إجمالي كمية الأدلة العلمية المتاحة بما في ذلك البيانات المستمدة من التجارب السريرية الكافية والمراقبة جيداً، إذا كان ذلك متاحاً، فمن المعقول الاعتقاد بأن المنتج قد يكون فعالاً في التشخيص، أو العلاج، أو الوقاية من كوفيد-19، أو مرض أو حالة خطيرة أو مهددة للحياة بسبب كوفيد-19؛ وأن الفوائد المعروفة والمحتملة للمنتج، عند استخدامه للتشخيص، أو العلاج، أو الوقاية من مثل هذا المرض أو الحالة، تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة لهذا المنتج؛ وأنه لا توجد بدائل ملائمة ومعتمدة ومتاحة.

يجب استيفاء جميع هذه المعايير للسماح باستخدام المنتج في علاج المرضى في أثناء جائحة كوفيد-19. يسري مفعول تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ الخاص بعقار باكسلوفيد طوال مدة إعلان كوفيد-19 الذي يبرر الاستخدام الطارئ لهذا المنتج، ما لم يتم إنهاؤه أو إلغاؤه (وبعد ذلك لا يجوز استخدام المنتجات بموجب تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ).

معلومات إضافية

للأسئلة العامة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني أو اتصل برقم الهاتف الوارد أدناه.

رقم الهاتف	الموقع الإلكتروني
1-877-219-7225 (1-877-C19-PACK)	www.COVID19oralRx.com [qr code]

يمكنك أيضًا الانتقال إلى www.pfizermedinfo.com أو الاتصال على الرقم 1-800-438-1985 لمزيد من المعلومات.



تم التوزيع بواسطة

Pfizer Labs

Division of Pfizer Inc.

NY, New York

10017

LAB-1494-8.0

تمت المراجعة: 26 سبتمبر 2022